

ADMINISTRACIÓN SEGURA MEDICAMENTOS EN EL HOGAR

⚠ Errores Más Frecuentes

- Medicamento equivocado (por nombres o envases similares).
- Dosis incorrecta (por preparación o confusión en la receta).
- Horario inadecuado (afecta la eficacia del tratamiento).
- Vía equivocada (ej. oral vs. intravenosa).
- Omisión de dosis (falta de control o esquemas complejos).

¿Por qué es importante?

- En casa hay menos supervisión médica → mayor riesgo de errores.
- Según la OMS (2017), muchos eventos adversos por medicamentos son prevenibles.
- El ISMP (2021) reporta que el 30% de errores en el hogar son por una mala administración.

CONSECUENCIAS CLÍNICAS

Mayor riesgo de:

1

Ineficacia



Recaídas



Resistencia



Intoxicaciones



BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE/CUIDADORES

2


Comprensión del tratamiento = mejor adherencia.

Detección temprana de efectos adversos.


Reducción de errores hasta un 30%.

LOS 5 CORRECTOS DE LA MEDICACIÓN

3



Paciente correcto



Medicamento correcto



Dosis correcta



Vía correcta



Hora correcta

ENTORNO SEGURO PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS

- Limpieza, iluminación, orden.
- Sin ruido ni distracciones.
- Material listo y zona segura.

SIGNOS DE ALARMA

- Náuseas, erupciones, dificultad para respirar.
- ¿Qué hacer? Detener, observar, contactar, anotar.

ENTORNO SEGURO PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS

- Vía intravenosa → asepsia rigurosa.
- Oral → capacidad de deglución.
- Subcutánea → rotación de sitios.

Tópica/Oftálmica → no contaminar.



ENTORNO SEGURO PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS

- Temperatura adecuada.
- Lejos de niños o personas con deterioro cognitivo.
- Ver fechas de vencimiento.

ACTUAR ANTE ERRORES

- No ocultar ni duplicar dosis.
- Contactar a profesional.
- Registrar todo.